

MANUAL PARA EL
MÉDICO VETERINARIO



BAGOGARD^{FEL}

EL GUARDIÁN DE SU SALUD

ANTIPARASITARIO
EXTERNO PARA
FELINOS



CONTROL Y PREVENCIÓN
DE INFESTACIONES.



pets.biogenesisbago.com



Biogénesis
Bagó

ÍNDICE

1

Acerca del producto
PÁG 4 - 5

2

Acción contra pulgas
PÁG 6

3

Beneficios
PÁG 7

4

Posología y administración
PÁG 8

5

Contraindicaciones y precauciones
PÁG 9 - 10

6

Indicaciones finales
PÁG 11



BAGOGARD^{FEL}

A los gatos les encanta compartir con sus tutores el mayor tiempo posible, ambos merecen una convivencia sana libre de estrés.

Gatos y familias protegidos.

Como veterinario tenés un rol importante porque la calidad de esta relación depende de vos. Nadie más que vos sabe lo importante que es garantizar una protección rápida y fácil de aplicar.

La confianza es esencial en tu profesión, por esta razón, te presentamos una solución ectoparasitocida libre de estrés. Con un principio activo seguro y potente que brinda confort y protección a los gatos fortaleciendo la relación con sus tutores.



**Biogénesis
Bagó**

Protección sin estrés, bienestar que se nota.

BAGOGARD^{FEL} es un ectoparasiticida de última generación diseñado específicamente para gatos, con Imidacloprid al 10%, un neonicotinoide de acción rápida y prolongada que elimina pulgas adultas por contacto antes de que puedan picar y alimentarse. Su innovador mecanismo de acción interfiere en el sistema nervioso central de los insectos, provocando hiperexcitación, parálisis y muerte.

Al distribuirse de manera uniforme sobre la piel y el pelaje del gato, **elimina el 98-100% de las pulgas en 24 horas y previene reinfestaciones por hasta 4 semanas.**

Su almacenamiento en las glándulas sebáceas permite una liberación progresiva y sostenida, asegurando protección continua sin necesidad de absorción sistémica.

Un gato sano y libre de parásitos es un gato feliz.

Este producto está diseñado para fortalecer el vínculo entre el gato y su tutor, proporcionando una solución antiparasitaria eficaz, segura y fácil de aplicar, que mejora el bienestar del animal y reduce el estrés asociado a la infestación por pulgas.



**PROTECCIÓN
ASEGURADA**

ELIMINA Y CONTROLA
pulgas adultas





BAGOGARD^{FEL}

ANTIPARASITARIO EXTERNO PARA FELINOS



Desde las
10 semanas
de vida



Uso externo:
Solución tópica
spot-on.



Aplicación
mensual

PRESENTACIÓN: Pipeta de 0.5 mL



BAGOGARD^{FEL}

Fórmula Cualicuantitativa

Imidacloprid ⁽¹⁾

10.0 g

Excipientes c.s.p.

100 ml

(1) Imidacloprid 1-(2-cloro-5-piridimetil)-2-(nitroimino) imidazolidina.



Espectro de acción y mecanismo sobre el ciclo parasitario



BAGOGARD^{FEL} está indicado para **prevenir y controlar** la infestación de:

- ✓ *Ctenocephalides felis* (pulga del gato). Eliminación de adultos y prevención de nuevas infestaciones.
- ✓ *Ctenocephalides canis* (pulga del perro). Eliminación en gatos que conviven con perros infestados.
- ✓ Colabora en el manejo del tratamiento de la dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP).

ENFERMEDAD
transmitida por pulgas

Teniasis
(enfermedad zoonótica).


ACCIÓN EN EL CICLO BIOLÓGICO DE LA PULGA

Adulto

Actúa eliminándolas antes de que puedan alimentarse y reproducirse.

Huevos y larvas

Aunque no tiene acción directa sobre estos estadios, al eliminar las pulgas adultas interrumpe la puesta de huevos, reduciendo significativamente la carga ambiental de pulgas en el entorno del gato.



IMPORTANCIA DEL MANEJO AMBIENTAL:

Para maximizar la efectividad del tratamiento y evitar reinfestaciones, se recomienda la limpieza (aspirado) frecuente del entorno del gato (camas, sillones, alfombras y otros lugares donde descansa) y, si es necesario, el uso de reguladores de crecimiento de insectos (IGR) en el ambiente.



Efectivo - Práctico - Seguro

Beneficios diferenciales de BAGOGARD^{FEL} frente a otras pipetas



Eficacia inmediata y sostenida

Actúa en 24 horas y protege por 4 semanas sin necesidad de refuerzos adicionales.



Acción por contacto, sin necesidad de picadura

A diferencia de otros antiparasitarios que requieren que la pulga se alimente, **BAGOGARD^{FEL}** elimina las pulgas antes de que se alimenten, reduciendo el riesgo de dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP).



Alta seguridad en gatos

Su formulación específica minimiza riesgos de toxicidad y reacciones adversas, a diferencia de productos con piretroides u otros compuestos menos selectivos para felinos.



Fácil aplicación, sin estrés para el animal

No requiere manipulación frecuente ni administración oral, lo que mejora la experiencia del gato y su relación con sus tutores.



Resistente al agua

Su vehículo lipofílico mantiene la eficacia incluso si el gato se moja ocasionalmente.



Complemento ideal

Para un protocolo integral de salud veterinaria recomendada por veterinarios como parte de una estrategia de control de ectoparásitos y bienestar felino.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA

El **Imidacloprid** se distribuye de manera transdérmica sin absorción sistémica significativa. Se almacena en las glándulas sebáceas y se libera de forma gradual, proporcionando una protección prolongada.

Su mecanismo de acción **bloquea los receptores nicotínicos de acetilcolina en los insectos**, generando hiperexcitación, parálisis y muerte de la pulga. Esta acción específica minimiza los efectos adversos en mamíferos, garantizando un amplio margen de seguridad en gatos.


MODO DE APLICACIÓN



1
Extraer la pipeta y mantenerla en posición vertical.



2
Romper la punta de la pipeta y separar el pelo de la base del cráneo hasta exponer la piel.



3
Aplicar todo el contenido en un solo punto, evitando el lamido por parte del animal.



4
No masajear ni bañar al gato durante las primeras 24 horas antes o después de la aplicación.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN



Frecuencia de administración:
Aplicar una vez al mes o según criterio veterinario.



Gatos de hasta 5 kg
1 pipeta de 0.5 ml



Gatos de 5 a 10 kg
2 pipetas de 0.5 ml

Contraindicaciones y precauciones

- No utilizar en gatitos menores de **10 semanas de edad**.
- No aplicar en animales enfermos, debilitados o con hipersensibilidad al Imidacloprid.
- No bañar al gato durante las primeras 24 horas antes o después de la aplicación.
- Evitar el contacto del producto con los ojos, mucosas o heridas abiertas.
- Es peligrosa su ingestión y aspiración.
- Lavarse bien las manos con abundante agua y jabón al finalizar la aplicación.
- No comer, no beber ni fumar durante la aplicación.
- Mantener fuera del alcance de niños, animales domésticos y alimentos.





Reacciones adversas

En casos aislados e individuales, en animales sensibles puede presentarse una reacción de hipersensibilidad en el punto de aplicación.

Dado que la formulación tiene un sabor amargo, si el animal lame el sitio de aplicación, no debe alarmar la presencia de hipersalivación transitoria inmediatamente después de la administración. Esto no es signología de intoxicación y desaparece algunos minutos después, sin necesidad de aplicar tratamiento alguno.



Sobredosificación

El modo de empleo y la presentación del producto hace improbable la intoxicación por sobredosificación.



Estudios de seguridad

Los estudios toxicológicos han demostrado que el Imidacloprid posee un margen de seguridad amplio en felinos, incluso en dosis superiores a las recomendadas. No se han reportado efectos adversos significativos en tratamientos prolongados bajo condiciones de uso adecuadas.



Almacenamiento y presentación

- Conservar en un lugar seco, a temperaturas inferiores a 30°C, protegido de la luz solar.
- No exponer a temperaturas de refrigeración. No congelar.
- Los envases utilizados deberán ser descartados según la legislación vigente.
- Presentaciones disponibles: 0.5 ml en envases individuales.



Bienestar felino y relación humano-gato-veterinario

El control efectivo de ectoparásitos no solo protege la salud del gato, sino que también reduce el estrés en el hogar, promoviendo una mejor convivencia entre el animal y su tutor.

Al ser un producto fácil de aplicar, seguro y sin estrés, **BAGOGARD^{FEL}** contribuye a una experiencia más positiva para el gato, fortaleciendo el vínculo con su familia y con el veterinario.

Para más información, consulte con su médico veterinario

BAGOGARD^{FEL}

EL GUARDIÁN DE SU SALUD



Bibliografía

- C. McCoy. 2008. *Flea blood feeding patterns in cats treated with oral nitenpyram and the topical insecticides imidacloprid, fipronil and selamectin.*
- H. Mehlhorn. 2001. *Comparative study on the effects of three insecticides (fipronil, imidacloprid, selamectin) on developmental stages of the cat flea (Ctenocephalides felis Bouché 1835): a light and electron microscopic analysis of in vivo and in vitro experiments.*
- M. C. Cadiergues. 2001. *EComparison of the activity of selamectin, imidacloprid and fipronil for the treatment of dogs infested experimentally with Ctenocephalides canis and Ctenocephalides felis felis.*
- M. Franc. 1998. *Antifeeding effect of several insecticidal formulations against Ctenocephalides felis on cats.*
- M. Rust. 2005. *Advances in the control of Ctenocephalides felis (cat flea) on cats and dogs.*
- M. W. Dryden. 2005. *Comparative speed of kill of selamectin, imidacloprid, and fipronil-(S)-methoprene spot-on formulations against fleas on cats.*
- R. Schenker. 2002. *Comparative speed of kill between nitenpyram, fipronil, imidacloprid, selamectin and cythioate against adult Ctenocephalides felis (Bouché) on cats and dogs.*



**Biogénesis
Bagó**